En 2 fois N°. 44

Observation Sur une Contusion à La Region Epigastrique, Suivie d'un Epenchement Considerable de Sang, dans le bas ventre,

Il Est tres ordinaire de voir des Epenchements Succéder aux Playes pénétrentes dans le bas ventre; il n'en Est pas ainsy des Contusions, qui ne peuvent occasionner Louverture des vaisseaux qui y sont Contenus que par la violence de la percussion, tel qu'est le Sujet du Memoire dont je vais avoir Lhonneur de faire La Lecture a Lacademie;

Mess.rs de Garengeot, vacher, Le petit fils, ont fourny à Lacademie plusieurs observations qui ont beaucoup de Rapport avec Celle dont il Sagit icy; qui Toutefois differe, par la Multiplicité des accidents dont La maladie à Esté Compliquée;

(Marginal addition: + Et par Sa cause Et.)

Le 10.e avril 1754, je fus apellé sur Les onze heures du Soir pour Secourir un jeune homme agé de 22. ans, d'une Constitution forte Et robuste, je Le Trouvay En Syncope, une Sueur froide par Tout son Corps, une pasleur Mortelle Et Le poulx presque Eteint;

M'Etant à l'instant informé, des assistans, de ce qui avoit peu occasionner des accidents Si facheux, j'apris, qu'il y avoit Environ deux heures que Le malade avoit Esté frapé d'un Coup de pied de Cheval, qu'environ demie heure auparavant, il avoit amplement Mangé, qu'il ne Tomba point à L'instant qu'il Recut Le Coup, Et qu'environ deux minutes apres, ayant fait 7 à 8 pas, il vomit à differentes reprises Et Tomba dans La Syncope sus Enoncée;

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 57 n° 44

L'ayant Examiné, je Trouvay En Effet vne Legere flogose — Marquant parfaitement La figure d'un fer à cheval, dont vne des branches avoit porté Sur Le cartilage xyphoide, Sur Ceux des 1.eres fausses Côtes du côté droit, Et L'autre branche avoit porté Environ deux poulces au dessous desdits Cartilages;

Pour Calmer les accidents presens Et prevenir, autant qu'il Seroit Possible les Consecutif, je Le Saignay Trois fois dans La nuit, Et cinq- fois Le jour Suivant, Et Ne Luy fis donner pour Toute boisson que de L'eau de poulet Et vne infusion de Thé, L'vne Et L'autre Tres Legere, Et par intervale quelque Cuillerée d'huyle d'amande douce; il vomissoit L'vn Et L'autre peu de minutes apres L'avoir pris; Les mêmes accidents Continuant Le Troisieme jour, je Le Saignay trois fois; Le Malade Ne rendant pas vne Seule goute d'vrine, je luy avois fait donner Le Second jour vn Lavement Emolient, je le fis réiterer Le troisieme, il Ne rendit L'vn Et L'autre qu'au bout de quarante huit heures de L'accident primitif; il Se fit à Ce terme, vne Evacuation abondante par les Selles dans Laquelle Se trouva du Sang, Tant Liquide qu'en caillots pouvant Estre Evalüé à pres d'vne pinte;

Immediatement apres La Susdite Evacuation, Les accidents Se modererent, Le malade Ne vomit qu'vne partie des boissons, Tout Le corps Se ranima, Le poulx En fit de même, Et La fievre Se dévelopa, La Région Epigastrique Etoit fort douloureuse Et Mediocrement Tendüe, Sur Laquelle j'appliquay ainsy que j'avois fait les deux jours précédents, vne ambrocation d'huyle Rosat Et des Compresses Trempées dans L'Eau Et L'Eau de vie Souvent réiterées Et le bandage de corps;

Le 4.eme jour je Le Saignay vne fois Et Luy fis des fomentations Sur Tout Le ventre, avec vne decoction Emoliente animée avec

L'eau ~~de~~ devie, Et luy fis donner plusieurs Lavements avec la même decoction; Le 5.ème jour il fut Saigné vne fois, Et au Surplus Les mêmes Soins;

Le 6.ème jour, La fievre qui avoit beaucoup diminuée Les deux jours Précédents reprit avec force, Sans que La tention, ny Les douleurs de L'abdomen parussent L'occationner, Mais Le Malade Sentit au Même Tems, vne douleur de Tête des plus violentes avec Elancements au Moindre Mouvement, Comme Le Malade avoit alors Esté Saigné Treize fois, je voulus menager La Saignée de La jugulaire qui me paroissoit jndiquée, Néanmoins Le Lendemain les mêmes accidents ayant augmenté, Et le Malade rendant Le Sang par Le Nez. je fis La Saignée qui Le Soulagea dans L'jnstant, Et Le delivra peu d'heures apres Totalement de La douleur, La fievre Tomba de même, Le ventre Etoit Souple Et Tres peu Sensible au Toucher, je Continuay Les fomentations, Les Lavements, Les potions huyleuses La diete &c.;

Le 9.ème jour La nature jndiquant Les Evacuans je luy fis donner vn Minoratif avec La Manne Et L'huyle d'amande douce, qui opera Tres bien, Et Le Malade parut, ainsy que Les quatre jours Suivants dans vne parfaite Convalescence, Sans fievre, Sans douleur quelconque des forces Suffisantes pour Se promener dans L'apartement, Même pour Sortir Si on Luy Eut permis, Toutes Les fonctions Se faisant parfaitem.t; jl avoit vne faim dévorante, Enfin paroissant hors de danger En observant Les ménagements réquis, jl avoit pris Le onze vn pareil Minoratif que Le premier qui avoit opéré de même;

J'obseray Néantmoins pendant Cette jntervâle que Malgré Le Calme de Tous Les accidents Et L'Etat de Sérénité ou Etoit Le blessé, qui Se Croyent Parfaitement guery, que Son pouls N'étoit pas Net, Etant Toujours petit Et Consentré, Ce qui me faisoit Craindre qu'il ne Se passat quelque Chose

de facheux jnterieurement qui pourroit se dévéloper d'un jour à l'autre
Pourquoy je l'exortois de mon mieux à observer le repos et un régime Convenable;
Jl est necessaire que j'aye l'honneur d'observer à l'academie que le Malade
avoit eu Environ deux ans auparavant une hernie jnguinale du côté
gauche, pour laquelle jl avoit porté pendant quelque Tems un Bandage
qu'il avoit quité depuis Environ trois mois ne s'apercevant point qu'elle
sortit; averty de Cette Circonstance dès le Commencement de la maladie,
j'avois plusieurs fois Examiné l'Etat des anneaux et du scrotum, sans y avoir
Rien Trouvé de Contre Nature;
Le retour que je Craignois de quelque accident Caché, et que j'ay Cy dessus
Exprimé, se verifia; La nuit du 13.e au 14 de la maladie, le blessé s'Etant
Couché En bon Etat En apparence, s'eveilla ayant des douleurs Tres violentes
dans la région ombilicâle et hypogastrique, ainsy que vers l'anneau ou avoit
Estée la hernie, jl s'aperçut même qu'elle Etoit sortie, C'est à dire que
le scrotum Etoit Considerablement remply du Côté gauche; je fus averty
de grand Matin de Ce nouvel accident; je Trouvay tout l'abdomen tendu
et douloureux, la Tumeur du scrotum Considerable et Tres dure; Prevenû que
j'étois de l'ancienne hernie je fus porté à Croire que ladite Tumeur Etoit
Causée par la presence d'une portion de l'Epiploon, n'y ayant Eu aucun
signe n'y accident qui annonçat que l'jntestin y fut Engagé; je fis les
Tentatives requises pour la faire rentrer, mais Trouvant Trop de
Resistance, j'appliquay la decoction et pulpes Emolientes Tant sur le
Ventre, que sur la Tumeur, souvent réïterées, je luy fis donner des
lavements frequents avec la même decoction qui opererent Tres bien,
j'y joignis des potions huyleuses et la diete severe;
Et attendû la violence des douleurs, de la Tention, et des vomissements qui
survinrent par jntervâle, (accidents que j'atribués au déplacement et
Tiraillement des parties que je pençois Estre Engagées dans l'anneau)
je le saignay deux fois; Tous ses soins opererent une diminution marquée

De Tous Les accidents, neanmoins il ne fut pas possible Ce jour La de faire rentrer La Tumeur, je fis Continuer La nuit Les mêmes moyens;

Le Lendemain 15.e de La maladie, je fis La reduction de La Tumeur avec assés de facilité, et j'entendis le même bruit que font La plus part des hernies Lors qu'elles rentrent; je me flatois alors que les accidents diminueroit, je luy apliquay un bandage Malgré Lequel la Tumeur ressortoit de tems à autre, et chaque fois je La faisois rentrer; Comme le bandage Etoit Mal fait et blessoit Le Malade, je fis apeller M.r Suret mon Confrere qui apres avoir Examiné La partie plaça un autre bandage tres bien Conditionné, Malgré son Exacte aplication La Tumeur sortoit plusieurs fois Par jour jusques au vingt et un de La maladie que je La trouvay si grosse et si dure qu'il ne fut plus possible de La reduire;

Pendant Cette Espace de six jours, j'observay qu'à mesure que L'abdomen s'affaissoit peu à peu, il restoit une Espece de Tumeur plus tendüe que le Reste, s'etendant depuis un poulce au dessus de L'ombilic, jusqu'aux os-Pubis, ayant quatre à cinq poulces de Largeur, Laquelle s'evasoit un peu de jour en jour sur Les parties Laterales; Et quoy qu'il ne fut pas possible d'y sentir de fluctuation, je soubçonnay qu'elle pouvoit Etre formée Par du Sang Epanché sur la surface des intestins;

Cette Reflection me Conduisit à presumer que la Tumeur du scrotum qui s'Etoit tant de fois formée Malgré La juste aplication du bandage, Et celle que je fis que Chaque fois que je faisois rentrer La Tumeur, les accidents Loin de diminuer Sembloit augmentoit; je pensay donc dis je, par La Combinaison de ses differentes Circonstances, que La Tumeur du scrotum pouvoit Etre une Continuité de Celle de La Region hypogastrique, Consequament formée d'une portion du sang Epanché, qui ayant trouvé Le peritoine disposé à ceder à sa pression de Ce Côté là, s'Etoit glissé avec Luy dans L'anneau

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Et dans La Tunique vaginale, pour y former La Surdite Tumeur;
Je L'Examinay alors avec plus d'attention, Et quoy quelle fut Tres dure
il me parut y apersevoir quelque fluyde, Et je priay Mr. Suret qui
voyoient Le Malade Tous Les jours, Et Mr. Bourdelin qui y avoit Esté
appellé par La famille, de L'Examiner de même; Comme Le fait
Paroissoit douteux, nous Ne pummes Convenir Sur Son vray Caractere;
J'engageay Et pressay La famille, ainsy que J'avois deja fait plusieurs
fois d'apeller En consultation quelqu'autre de Mes Confreres; Elle fit Choix
de Mr. Moreau qui apres avoir Entendû Le detail des Circonstances
que je luy fis de La maladie, Mr. Suret present, Et avoir Examiné L'Etat,
des parties, Ne hesita pas à confirmer L'idée que J'avois de L'Epanchement
dont J'ay parlé Cy dessus, ainsy que La communication qu'il pouvoit
y avoir de L'une à L'autre Tumeur; Nous Convimes de faire L'ouverture
de celle du scrotum, afin de donner issüe au Sang, Et faire rentrer
Les parties, S'il Si En Trouvoit, Ce qui fut Executé Le Lendemain 24e. de
La maladie apres une Saignée préparatoire;

Je La fis de La Même façon que Se fait L'opperation du Bubonocelle,
En presence de Mrs. Bourdelin, Moreau, Suret &a.: à L'ouverture du
Sac il S'élança une Colomne de Sang assés Considerable; apres avoir
fait Les dilatations Suffisantes Nous En Trouvames En Caillots, pouvant
Le tout Estre Evalüé à demy Septier, Et point de parties, je dilatay
L'anneau Et portay Le doigt jusques aux jntestins, Sans qu'il S'en Ecoulat
que Tres peu de Sang; J'jntroduisis dans L'anneau un Bourdonnet Lié
Suffisant pour En Tenir Les parois Ecartés, nous Le retirames Le Soir du
Même jour Mr. Moreau Et Moy, Et il Ne passa point de Sang, non
plus que Les deux jours Suivants;
Le 4eme. jour de L'operation au 6e. pensement, J'en Trouvay Tout L'apareil
Et une partie du Lit Beigné, ayant ôté Le Bourdonnet, il En ruissela
d'une Couleur Et consistance Naturelle Et Sans aucune odeur Environ

Chopine, Le Soir du même jour il En Sortit pres de deux Septiers de même Nature, Le jour Suivant il En Sortit Tres peu malgré les differentes Situations Et une Legere pression que je faisois Sur Le ventre du Malade; Mais Le 6.e jour de l'operation il En Sortit une quantité beaucoup plus grande qu'il N'avoit Encore fait Et j'observay qu'il avoit Moins de Consistance Et la Couleur Moins vermeille; de Ce jour La quantité devint Moindre, Et la Couleur Palit Et acquit une fetidité de jour En jour plus grande, au Point qu'au dixieme jour de l'operation, Ce N'etoit plus qu'une Serosité bourbeuse;

Pendant Cet Espace de Tems je pençois La playe avec un digestif bien annimé, Malgré Lequel Toujours abreuvé des Serosités qui S'Ecouloient du bas ventre, Etoit Toujours blafarde Et N'annonçoit aucun produit de la part des Sucs Nourriciers pour La Régénération des Chairs; Le Scrotum qui Etoit Considerablement Engorgé Menaçoit de gangrene, je Le récouvrois d'un Emplatre d'Ostirax annimé avec l'Eau de vie Camphrée, Lequel récouvroit Egallement Les plumaceaux de La playe, quoyque Le Malade N'Eut que des douleurs Tres Suportables, il n'etoit point Sans fievre, Elle Etoit Continüe, je Luy faisois observer une diete Exacte;

il faut observer que pendant Tout Le Cours de Ses pencements Et Malgré les grandes Evacuations qui Se faisoit, Tant par La Playe que par les Selles à la faveur des Lavements, La Tention du ventre Subsistoit Toujours particulierement La Tumeur de La Region ombilicale Et hypogastrique qui Conservoit Toujours une Espece de Circonscription, Sans aucune fluctuation N'y Sensibilité Même au Toucher;

Pendant Tout Le Cours de La Maladie, Et des L'instant que La Syncope

Permit au Malade de S'ennoncer, il Seplaignit, par intervales d'une doulour profonde immediatement sous Lomoplate gauche, qui Certains Momens et des jours Entiers même Sembloit disparoître Totalement, ayant plusieurs fois Examiné La partie et n'y ayant rien Remarqué d'extraordinaire je Consideray d'abort Ladite douleur Comme Etrangere à la maladie principale; Cependant le 11^eme^ jour de l'operation, Cette douleur devint Continüe et gena Considerablement La Respiration, j'examinay de Nouveau la partie et trouvay un leger Gonflement oedemateux au dessous de l'omoplate d'environ quatre poulces d'Etendüe En tous Sens, forment un rond, peu Sensible au toucher, qui toute fois me fit Soubtonner un depot dans la capacité de la Poitrine, et Si les forces du Malade Eussent peu le permetre, j'aurois Rédemandé Conseil, et proposé l'operation de l'empiesme; Mais il n'y avoit alors aucun fruit à En Esperer, et l'opression augmenta à un tel point Malgré tous les Secours quil fut possible de luy administrer, quil le fit perir le 37^eme^ de la maladie et le 15^eme^ de l'operation;

Je fis Louverture du Cadavre, et je trouvay les intestins aderents au peritoine et Entre Eux presque dans toute Leur Etendüe, Ladernée Tres facille à detruire, Etant gangrenée ainsy que La Totalité de l'Epiploon;

Je Trouvay la face Externe et Convexe du grand Lobbe du foye qui avoit deu Estre frapée par le Coup, En bon Etat, et je trouvay un depot à la face posterieure et Concave, dont une grosse portion Etoit Tombée En pourriture;

Je trouvay un autre depot, ou Epenchement Considerable dans la Region iliaque gauche, occupant depuis La hauteur du rein jusques au fonds du bassin, dans Lequel Etoient pres de trois,

Chopines d'vne Liqueur blanchatre et bourbeuse, La même qui
Sortoit par L'anneau et La playe Lors des pencements, ou Elle ne
Pouvoit parvenir que par régorgément, attendu Sa Situation, et au fonds
duquel Epenchement Etoient vne asses grande quantité de matiere purulente
grumellée, sans qu'aucune des parties voisines fut vlcerée;
Les intestins Etoit Extremement pleins d'air, et leur gonflement formoie
La Tumeur que j'ay dit avoir Subsisté à la region ombilicale et
hypogastrique, ainsy que La Tention de Tout L'abdomen, et ils Se
Trouvoit, pour ainsy dire Soulevés et flotans Sur Le fluy de de
L'Epenchement Cy dessus;
ayant Ensuite ouvert La poitrine je Trouvay vn Epenchement du Côté
gauche, d'vne Serosité Limpide d'Environ vne pinte au Moins, et
sous Ce Liquide vne tres grande quantité de matiere purulente vers
la baze du poulmon que je trouvay detruite En grande partie
par Le depot qui y Etoit, et qui avoit fourny Ladite matiere; et
qui vraisemblablement N'avoit Esté Causé, que par La violence
de La Secousse et Commotion que receut La poitrine dans L'jnstant
du Coup, Le Malade S'en Etant plaint pendant Tout Le Cours
de La Maladie, et N'y ayant Eu auparavant aucun Signe qui ait
peu faire Soubçonner aucune disposition antecedente.

Broqua

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 57 n° 44